

AGRONPAXI

FICHA TÉCNICA



FOLIZYME GA

EL FOLIAR TOTAL
FERTILIZANTE INORGÁNICO



COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN

	P/V
NITRÓGENO (N)	12%
POTASIO(K ₂ O)	3%
CALCIO (CaO)	3%
MAGNESIO (MgO)	1,0%
MANGANESO (Mn)	0,30%
ZINC (Zn)	0,30%
HIERRO (Fe)	0,20%
BORO (B)	0,10%
COBRE (Cu)	0,10%
MOLIBDENO (Mo)	0,05%
COBALDO (Co)	0,01%
pH	1,00 - 2,00

APLICACIÓN FOLIAR

FOLIZYME GA es un producto completo con macro y micronutrientes diseñado para nutrir y estimular el crecimiento de la planta en todas sus etapas: temprana, reproductiva, llenado de frutos, tubérculos, raíces, espigas; y para ayudar a recuperar plantas afectadas con estrés asociado a condiciones extremas de temperatura, fitotoxicidad y estrés propio de la planta en sus etapas fenológicas y de manejo (enraizamiento después del trasplante, después del aporque, floración, entre otros.).

FOLIZYME GA contiene Nitrógeno Amínico, listo para ser empleado en las reacciones metabólicas de la planta reduciendo la inversión de energía en la absorción de éste elemento; así como de los micronutrientes que complementan funciones adicionales como co-factores enzimáticos. Ayuda a la planta a ser más eficiente en la producción y calidad de sus cosechas.

FOLIZYME GA incrementa el número de rebrotes por corona o unidades productivas.

FOLIZYME GA disminuye las altas concentraciones de Etileno, y reduce su efecto en el estrés.

FOLIZYME GA provee de mayor desarrollo radicular, más yemas de fructificación, mayor producción de partes cosechables, logra frutos de mayor tamaño, y más ramas laterales.

FOLIZYME GA Consigue que la planta tenga una arquitectura adecuada, con entrenudos más cortos y ramas más gruesas.

INSTRUCCIONES DE USO

FAVOR SEGUIR EL SIGUIENTE ORDEN DE MEZCLA:

1. AGUA
2. FOLIZYME GA
3. PESTICIDA

Agite FOLIZYME antes de utilizarlo. Disuelva en una pequeña cantidad de agua la dosis recomendada del producto. Posteriormente agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida hasta completar el volumen de aplicación. Mueva la mezcla para homogeneizar antes de cada aplicación.

Aplicar en las horas de menor temperatura, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde. FOLIZYME GA no causa fitotoxicidad cuando se usa a las dosis recomendadas. No usar más de 5.0 L de FOLIZYME GA en 200 L de agua.

INCOMPATIBILIDAD: FOLIZYME GA es de naturaleza ácida (pH 1,68), siendo compatible con la mayoría de pesticidas. No mezcle con Aceite Mineral ni con compuestos a base de Cobre Amoniacal.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA. LTDA.
info@agronpaxi.com/www.agronpaxi.com

CATEGORIZACIÓN ESPECIAL	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
HORTALIZAS Y CULTIVOS DE SIEMBRA DIRECTA	5,0 L/Ha	Etapa de desarrollo	Foliar, 4 aplicaciones cada 10 a 15 días
VID, FRUTALES CADUCOS Y NUECES	10,0 L/Ha	Periodo de dormancia Desarrollo de cultivo	Foliar /Drench, 3 aplicaciones cada 15 a 20 días
CÍTRICOS Y ARBOLES FRUTALES SIEMPRE VERDES	10,0 L/Ha	Etapa de prefloración	Foliar, 5 - 7 aplicaciones al año, cada 30 días
FLORES Y ORNAMENTALES	4,0 L/Ha	Inicio de brotamiento	Foliar, 4 aplicaciones cada 10 a 15 días

PRESENTACIÓN DE VENTA:

125 ml 250 ml 500 ml
1 L 20 L 208 L

REGISTRO AGROGALIDAD.

061-F-AGR-T



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. AGRONPAXI: 0994423585

**CONSERVESE EN LUGAR FRESCO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGERIR**

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo." **Es importante determinar las condiciones locales de cada cultivo y seguir las recomendaciones del especialista."**

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". "USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc." "ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón." "No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales." "No permita animales en el área tratada." "No contamine fuentes de agua." "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente." "No emplear este envase para ningún otro fin." "No re envasar o depositar el contenido en otros envases." "Conservar el envase en un lugar seguro, fresco y seco y lejos de alimentos, los niños y los animales." "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin."

Titular del registro y fabricante:
AGRONPAXI CIA. LTDA.

Panamericana Norte Km 12

Latacunga - Ecuador

Tel: (593) 3 2719113

Duran - Ecuador

Tel: (593) 4 3901595

Fabricado por:

STOLLER ENTERPRISES INC.

PERU

GARANTÍA: La información contenida en este documento, está basada en los datos disponibles y más actualizados al momento de su emisión. Los usuarios deben asumir la responsabilidad de observar las regulaciones a nivel nacional, además de seguir estrictamente las sugerencias de uso dadas por el fabricante en la etiqueta. La información que figura en esta etiqueta no excluye al usuario de la propia evaluación de riesgo como lugar de trabajo exigida por la salud y seguridad.

