

AGRONPAXI

FICHA TÉCNICA



NBX

AUMENTA LA CARGA
FERTILIZANTE - INORGÁNICO
LÍQUIDO SOLUBLE (LS)



COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN	
	P/V
Boro (B)	7 %
pH	8,75 - 9,80

APLICACIÓN FOLIAR

NBX es un mejorador del crecimiento de la planta, que también aumenta los kilogramos cosechados cuando es aplicado en pre floración al promover una mayor diferenciación y división celular y una mejor redistribución de fotosintatos, dando lugar a una mayor producción.

NBX evita la alternancia en producción debido al debilitamiento y posterior aborto de nuevas yemas en el siguiente año, causado por la mala distribución de los fotosintatos que impide el desarrollo de éstas. Esto es consecuencia del desbalance hormonal que ocurre en el período reproductivo donde predomina la actividad de la Auxina sobre otras hormonas.

NBX estimula la producción de Citoquininas permitiendo un menor requerimiento de aplicación de esta hormona.

NBX promueve la producción de Poliaminas, compuestos naturales que otorgan mayor permeabilidad de las paredes y membranas celulares permitiendo la redistribución de los fotosintatos desde las hojas hacia los órganos de almacenamiento: frutos, tubérculos, coronas, tallos, etc.

NBX promueve la formación del sistema radicular con mayor número de raíces laterales y mas pelos radiculares para una mayor absorción de agua y nutrientes, previniendo la formación de una sola raíz pivotante.

NBX puede aportar a la planta algunas cantidades menores de ácido algínico, metinol, laminaria y otros polisacáridos que contribuyen al crecimiento y llenado de frutos de la planta.

INSTRUCCIONES DE USO

FAVOR SEGUIR EL SIGUIENTE ORDEN DE MEZCLA:

1. AGUA
2. FERTILIZANTE FOLIAR
3. NBX
4. PLAGUICIDAS .

Disuelva en una pequeña cantidad de agua la dosis recomendada del producto. Posteriormente agregue la mezcla en el tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen del agua a utilizar, agite y complete con el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar, antes de cada aplicación.

Aplicar en las horas de menor temperatura, ya sea en las primeras horas de la mañana o en la últimas de la tarde.

INCOMPATIBILIDAD: NBX puede aplicarse en el tanque de mezcla con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes foliares. Prevenir la mezcla con agentes oxidantes (percloratos, nitratos, nitritos, etc.) y con alta concentración de minerales ácidos. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizara en la aplicación. Mantener el pH de la solución sobre valores de 6 a fin de prevenir el riesgo de precipitación. No use adherentes en las aplicaciones de NBX. No use NBX si la planta esta en estado de senescencia o madurez natural, o ha sido atacada severamente por los insectos.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA. LTDA.
info@agronpaxi.com/www.agronpaxi.com

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solaum tuberosum</i>)	3 L/Ha	Pre floracion	Foliar
Mango (<i>Manguifera indica</i>)	3 a 5 L/Ha	15 a 20 dias antes de la floración	Foliar. Repetir al cuajado de fruto

CATEGORIZACION ESPECIAL	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Ciclo Corto	1 L/Ha	Etapa de diferenciación de yemas.	Foliar 3 a 4 aplicaciones cada 8 días.
Futales	2 L/Ha	Etapa de brotación.	Foliar 3 aplicaciones cada 14 a 21 días.

PRESENTACIÓN DE VENTA:

1 L 20 L 208 L

REGISTRO AGROGALIDAD 052-F-AGR-T



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. AGRONPAXI: 0994423585

**CONSERVESE EN LUGAR FRESCO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGERIR**

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo". **Es importante determinar las condiciones locales de cada cultivo y seguir las recomendaciones del especialista.**"

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". "USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc." "ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón." "No aplicar le producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales." "No permita animales en el área tratada." "No contamine fuentes de agua." "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente." "No emplear este envase para ningún otro fin." "No re envasar o depositar el contenido en otros envases." "Conservar el envase en un lugar seguro, fresco y seco y lejos de alimentos, los niños y los animales." "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin."

Titular del registro:
 AGRONPAXI CIA. LTDA.
 Panamericana Norte Km 12
 Latacunga - Ecuador
 Tel: (593) 3 2719113
 Duran - Ecuador
 Tel: (593) 4 3901595
 Fabricado por:
 STOLLER ENTERPRISES INC. PERU

GARANTÍA: La información contenida en este documento, está basada en los datos disponibles y más actualizados al momento de su emisión. Los usuarios deben asumir la responsabilidad de observar las regulaciones a nivel nacional, además de seguir estrictamente las sugerencias de uso dadas por el fabricante en la etiqueta. La información que figura en esta etiqueta no excluye al usuario de la propia evaluación de riesgo como lugar de trabajo exigida por la salud y seguridad.

