

AGRONPAXI

FICHA TÉCNICA



NITRATE BALANCER

TRASLOCADOR DE AZÚCARES
FERTILIZANTE LÍQUIDO INOGÁNICO



COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN

	P/P
BORO (B)	9%
pH	8,00 - 9,20

COMPATIBILIDAD ORGÁNICA



APLICACIÓN FOLIAR

NITRATE BALANCER facilita el transporte del Potasio a través de las membranas de las células, para que los azúcares puedan moverse desde las hojas hacia los tejidos de almacenamiento que se cosecharán.

NITRATE BALANCER favorece la conversión inicial de los Nitratos en la planta a formas nitrogenadas que contribuyan a incrementar los rendimientos, antes que favorecer únicamente el desarrollo vegetativo y fomentar el envejecimiento de la planta.

NITRATE BALANCER ayuda a controlar la demora en floración y fructificación, evitando la caída de flores y frutos, causada por el exceso de Nitratos.

NITRATE BALANCER tiene dos usos importantes en la agricultura moderna: Como corrector en los cultivos que tienen exceso de Nitrógeno y como movilizador o translocador de azúcares de las hojas a los frutos, antes de la cosecha.

NITRATE BALANCER inhibe el movimiento de las Auxinas, evitando el excesivo desarrollo aéreo de la planta.

NITRATE BALANCER incrementa la permeabilidad de las membranas, para mejorar la movilización de los azúcares producto de la fotosíntesis.

INSTRUCCIONES DE USO

FAVOR SEGUIR EL SIGUIENTE ORDEN DE MEZCLA: 1. AGUA 2. NITRATE BALANCER 3. PLAGUICIDA

Disuelva en una pequeña cantidad de agua la dosis recomendada de Nitrate Balancer. Posteriormente agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación.

Aplicar en las horas de menor temperatura, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde. No emplee en temperaturas mayores a 34°C o menores a 16°C.

Se recomienda usar Stoller Super K2O o Harvest More 5-5-45 en la misma proporción (1:1) para lograr una mayor translocación de azúcares.

INCOMPATIBILIDAD: El producto no genera incompatibilidad. No use adherentes en las aplicaciones de NITRATE BALANCER. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizara en la aplicación. NITRATE BALANCER usado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA. LTDA.
info@agronpaxi.com/www.agronpaxi.com

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
BROCCOLI (<i>Brassica oleracea L. var. italica</i>)	1,0 L/Ha	20 días antes de cosecha	Repetición a los 15 días.
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	2,0 L/Ha	45 días antes de la cosecha	Repetición a los 15 días.
TOMATE (<i>Solanum lycopersicum</i>)	1,0 L/Ha	3 semanas antes de la cosecha	Foliar 1 aplicación
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	2,0 L/Ha	3 semanas antes del corte de la parte aérea	Foliar 1 aplicación
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	1,0 L/Ha	3 semanas antes de la cosecha	Foliar 1 aplicación
CAÑA (<i>Saccharum officinarum</i>)	5,0 L/Ha	COMO ALTERNATIVA DE MADURANTE.	Foliar 1 aplicación
FRUTALES	1,0 L/Ha	45 Días antes de la cosecha.	Repetición a los 15 días.

PRESENTACIÓN DE VENTA:

250 ml 500 ml
1 L 20 L 208 L

REGISTRO AGROGALIDAD. 050-F-AGR-T



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. AGRONPAXI: 0994423585

**CONSERVESE EN LUGAR FRESCO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGERIR**

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo". **Es importante determinar las condiciones locales de cada cultivo y seguir las recomendaciones del especialista.**

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". "USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc." "ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón." "No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales." "No permita animales en el área tratada." "No contamine fuentes de agua." "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente." "No emplear este envase para ningún otro fin." "No re envasar o depositar el contenido en otros envases." "Conservar el envase en un lugar seguro, fresco y seco y lejos de alimentos, los niños y los animales." "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin."

Titular del registro:
AGRONPAXI CIA. LTDA.
Panamericana Norte Km 12
Latacunga – Ecuador
Tel: (593) 3 2719113
Duran - Ecuador
Tel: (593) 4 3901595
Fabricado por:
STOLLER ENTERPRISES INC. PERU

GARANTÍA: La información contenida en este documento, está basada en los datos disponibles y más actualizados al momento de su emisión. Los usuarios deben asumir la responsabilidad de observar las regulaciones a nivel nacional, además de seguir estrictamente las sugerencias de uso dadas por el fabricante en la etiqueta. La información que figura en esta etiqueta no excluye al usuario de la propia evaluación de riesgo como lugar de trabajo exigida por la salud y seguridad.

