

AGRONPAXI

FICHA TÉCNICA



ReZist

LA VACUNA PARA SUS PLANTAS
CONCENTRADO SOLUBLE (CP)



COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN	
	P/P %
COBRE (Cu)	1,75 %
MANGANESO (Mn)	1,75 %
ZINC (Zn)	1,75 %
pH 6,09 – 10,40	

APLICACIÓN FOLIAR

REZIST contiene componentes que activan y aumentan la expresión genética de la Resistencia Sistémica Adquirida (RSA) de manera que la planta genera sus mecanismos de defensa eliminando todo tipo de estrés además de estimular el rápido crecimiento.

REZIST actúa como una vacuna preventiva o curativamente.

REZIST aumenta la inmunidad de las plantas promoviendo la formación de enzimas activadas por Cobre, contribuyendo en la formación de Arginina, responsable de la formación de Poliaminas, un conjunto de proteínas naturales responsables de la inmunidad intermediadas por proteinasas activadas por el Manganeseo, disminuyendo las aminas e incrementando la actividad del ARN mensajero, debido a proteinasas activadas por el Zinc.

REZIST cambia el ciclo de la Metionina (Ciclo SAM) en la planta para:
Reducir el estrés por Etileno el cual debilita y rompe las estructuras de la pared celular.
Incrementar la producción de Poliaminas, los cuales son súper antibióticos.

REZIST Contiene Cobre, Manganeseo, Zinc y una combinación de Poliaminas que activa e incrementa la expresión genética incrementando la RESIA.

REZIST Logra una mayor resistencia al ataque de nematodos y virus y ayuda a superar daños causados por plagas.

REZIST Regenera los tejidos dañados por factores negativos de la producción.

INSTRUCCIONES DE USO


FAVOR SEGUIR EL SIGUIENTE ORDEN DE MEZCLA:

1. Agua 2. SETT 3. ReZist 4. Pesticida

Agite REZIST antes de utilizarlo, disuelva en un recipiente pequeño la dosis recomendada del producto. Posteriormente agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Mueva la mezcla hasta homogeneizar antes de cada aplicación. Aplicar en las horas de menos Sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en la últimas de la tarde. Recomendamos aplicar ReZist conjuntamente con Sett en relación 1:2. Repetir la aplicación de ReZist siempre antes de los 20 días.

INCOMPATIBILIDAD: ReZist puede utilizarse en todos los cultivos siguiendo las instrucciones de la etiqueta. ReZist puede aplicarse en el tanque de mezcla con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA. LTDA.
info@agronpaxi.com/www.agronpaxi.com



ReZist dirige el Ciclo de la Metionina (Ciclo SAM) a la producción de Súper Poliaminas, responsables de la Resistencia Sistémica Adquirida de la planta.

CULTIVO	DOSIS	ETAPA DE APLICACIÓN	FRECUENCIA DE APLICACION
LECHUGA. (<i>Lactuca sativa</i>)	1,0 Lt / Ha	Etapa de crecimiento	3 aplicaciones cada 21 días
BANANO (<i>Musa paradisiaca</i>)	500 ml/ Ha	Antes de floración	Cada 30 días
FLORES	0,5 ml / Lt agua	Antes de floración	Cada 30 días
ARROZ (<i>Oryza Sativa</i>)	500 ml/ Ha	Antes de floración	Cada 30 días
CACAO (<i>Theobroma Cacao</i>)	1,0 Lt / Ha	Antes de floración	Cada 30 días
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	500 ml/ Ha	Antes de floración	Cada 30 días
BROCCOLI (<i>Brasica oleracea var. Italica</i>)	500 ml/ Ha	Antes de floración	Cada 30 días
PAPAYA (<i>Carica Papaya</i>)	1,0 Lt / Ha	Antes de floración	Cada 30 días
PIÑA (<i>Ananas comosus</i>)	1,0 Lt / Ha	Antes de floración	Cada 30 días
MANGO (<i>Manguifera indica</i>)	1,0 Lt / Ha	Antes de floración	Cada 30 días
SANDIA (<i>Citrullus lanatus</i>)	500 ml/ Ha	Antes de floración	Cada 30 días

PRESENTACIÓN DE VENTA:
1 LT 20 LT 208 LT

REGISTRO AGROGALIDAD. 358-F-AGR

Titular del registro y fabricante:
AGRONPAXI CIA. LTDA.
Panamericana Norte Km 12
Latacunga – Ecuador
Tel: (593) 3 2719113
Duran - Ecuador
Tel: (593) 4 3901595
Fabricado por:

STOLLER ENTERPRISES INC. PERU
STOLLER ENTERPRISES INC. USA

GARANTÍA: La información contenida en este documento, está basada en los datos disponibles y más actualizados al momento de su emisión. Los usuarios deben asumir la responsabilidad de observar las regulaciones a nivel nacional, además de seguir estrictamente las sugerencias de uso dadas por el fabricante en la etiqueta. La información que figura en esta etiqueta no excluye al usuario de la propia evaluación de riesgo como lugar de trabajo exigida por la salud y seguridad.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. AGRONPAXI: 0994423585

CONSERVÉSE EN LUGAR CERRADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo". "Es importante determinar las condiciones locales de cada cultivo y seguir las recomendaciones del especialista."

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". "USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc." "ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón." "No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales." "No permita animales en el área tratada." "No contamine fuentes de agua." "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente." "No emplear este envase para ningún otro fin." "No re envasar o depositar el contenido en otros envases." "Conservar el envase en un lugar seguro, fresco y seco y lejos de alimentos, los niños y los animales." "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin."

